




دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گردستان

بیمارستان شهید بهشتی قزوین

آموزش به بیمار با موضوع: کاوازاکی

تشخیص علائم بیماری کاوازاکی



تهیه کنندگان: گروه آموزش به بیمار

تأیید کننده علمی: آقای دکتر حمید رضا نجفی
(متخصص کودکان و نوزادان)

بهمن ۱۴۰۱

در صورت دیدن این علائم به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه کنید:

درد شکم، بی قراری، استفراغ، گریه مداوم،
رنگ پریدگی، شوک و درد قفسه سینه
در کودکان بزرگتر.

منبع: پرستاری کودکان و ونگ



با آرزوی سلامتی و تندرستی

چند نکته در هنگام مصرف آسپرین

مصرف آسپرین فقط با دستور پزشک می باشد. از مصرف خود سرانه ی آن خودداری کنید. اگر کودک شما حین مصرف آسپرین در معرض بیماری آنفولانزا یا آبله مرغان قرار گرفت یا به این بیماری مبتلا شد بلافاصله به پزشک مراجعه کنید.

*در صورت علائم مسمومیت با آسپرین شامل سرگیجه و سردرد، ووزوز گوش، کبودی بی دلیل، خلط خونی، خون در استفراغ، خون در مدفوع به پزشک مراجعه کنید.

با انجام آزمایشات و معاینات بعدی که پزشک برای کودک تان تجویز می کند به شما و پزشک کمک می کند تا در مورد نبود مشکلات قلبی مطمئن شوید.



کاوازاکی

* یک بیماری نادر دوران کودکی است


* در اواخر زمستان و بهار بیشتر دیده میشود. این بیماری ارثی نمی باشد، قابل پیشگیری نیست و قابل سرایت به دیگران نمی باشد.

* معمولا کودکان زیر 5 سال را درگیر می کند. درپسران شایع تر است.

تعریف کاوازاکی

بیماری با علت ناشناخته میباشد که باعث التهاب عروق خونی در سرتاسر بدن می شود.

- علت ایجاد این بیماری ناشناخته است ولی احتمال می دهند منشأ عفونی داشته باشد و به دنبال افزایش پاسخ سیستم دفاعی بدن یا پاسخ نامناسب آن به عوامل عفونی باشد که این پاسخ نامناسب باعث التهاب عروق خونی سراسر بدن و تخریب عروق خونی می شود.



علائم بیماری چیست؟

* تب مداوم بالای 39 درجه سانتی گراد که به آنتی بیوتیک جواب نداده و بیش از 5 روز طول بکشد.

* قرمزی هر دو چشم

* ورم و قرمزی کف دست ها و کف پاها که

دردناک نیز میباشد.

* دانه های قرمز رنگ روی پوست شکم سینه و دستگاه تناسلی

* ورم کردن غدد لنفاوی گردن که دردناک نیز بوده و یک طرفه می باشد.

* قرمزی، خشکی و ترک خوردگی لب ها

* ورم زبان و سفید شدن و برآمدگی بزرگ روی زبان (زبان توت فرنگی)

تشخیص

تشخیص این بیماری مشکل میباشد زیرا هیچگونه آزمایشی برای تشخیص آن وجود ندارد .

۱- کودک شما برای بیش از ۵ روز تب داشته باشد.

۲- کودک شما حداقل ۴ مورد از علائم که قبل ذکر شده

را داشته باشد.

۳- انجام آزمایش خون و ادرار نیز معمولا انجام میشود.

۴- نوار قلب و اکوکاردیوگرافی برای بررسی درگیری عروق قبل معمولا انجام میشود .

درمان

همه کودکان مبتلا به کاوازاکی بایستی در بیمارستان بستری شوند. درمان شامل:

* تزریق ایمونوگلوبولین داخل وریدی. این دارو به بدن کمک میکند تا با عفونت مبارزه کند و التهاب رگ های خونی را کاهش می دهد.

* آسپرین که به کاهش تب و درد کمک میکند و خطر احتمالی لخته شدن خون را کاهش میدهد

* استفاده از آنتی اسید

* با تشخیص و درمان زود هنگام دوره بیماری کوتاه تر شده و احتمال ایجاد مشکلات قلبی را کاهش می دهد.

آموزش به والدین

- از رژیم غذایی نرم و مایعات که خیلی سرد و گرم نباشد استفاده کنید. کودک شما ممکن است خسته شود و گریه کند و یا پوست او برای یک ماه یا بیشتر خشک شود. از لوسیون مخصوص کودکان برای مرطوب نگه داشتن پوست استفاده کنید.

- درد مفاصل تا چند هفته ادامه دارد.

- از تزریق واکسن های حاوی ویروس زنده ی ضعیف شده تا یازده ماه پس از دریافت ایمونوگلوبولین وریدی با مشورت پزشک خودداری کنید.

- در صورت تب بالای ۳۸ درجه سانتی گراد در منزل به پزشک اطلاع دهید.