

قرص کلوپیدوگرل یا پلاویکس چیست؟



پلاویکس یک داروی ضد تجمع پلاکتی است که برای جلوگیری از تشکیل لخته در عروق مصرف می شود تا خون به راحتی در عروق جریان یافته و اکسیژن به ارگانهای حیاتی بدن مانند مغز و قلب برسد .



این دارو برای بیمارانی که در معرض افزایش خطر ابتلا به حملات قلبی یا سکته مغزی در آینده هستند تجویز می شود .

در صورت مصرف پلاویکس به نکات زیر توجه فرمایید :

• بیمارانی که پلاویکس مصرف می کنند باید از نوشیدن الکل جدا» خودداری نمایند . زیرا الکل میتواند احتمال خونریزی از معده و روده را افزایش دهد .

• در صورتی قرار است تحت عمل جراحی قرار گیرید یا قرار است به دندانپزشکی مراجعه نمایید ، موضوع مصرف پلاویکس را به اطلاع پزشک مربوطه برسانید . زیرا در مواردی لازم است که حداقل ۵ روز قبل از انجام اعمال مذکور از مصرف پلاویکس خودداری نمایید . تا مانع از خطر بروز خونریزی غیر قابل کنترل گردید .

• هرگز در زمانی که تحت درمان با پلاویکس هستید ، بدون مشورت پزشک از داروهای مسکن (داروهای ضد التهابی غیراستروئیدی) از قبیل ایبوپروفن ، دیکلوفناک و مفنامیک اسید و سایر داروها استفاده نکنید.

قبل از مصرف پلاویکس چه نکاتی را باید به کادر درمانی خود اظهار کنم ؟

• در صورتیکه نسبت به پلاویکس حساسیت دارید

، یا اگر مبتلا به خونریزی فعال مانند خونریزی از زخم معده و یا خونریزی مغزی (ناشی از ضربه مغزی) هستید ، هرگز پلاویکس مصرف نکنید .

• قبل از مصرف پلاویکس موارد زیر را به اطلاع پزشک خود برسانید :

- وجود هر گونه حساسیت دارویی
- ابتلا به بیماری کلیوی
- وجود هرگونه اختلال انعقادی در خون مانند بیماری هموفیلی
- سابقه سکته مغزی یا حمله های گذرای مغزی
- وجود مشکلات گوارشی مانند زخم معده یا مشکلات روده ای
- ابتلا به بیماری کبدی
- شیر دهی و بارداری

نکات مهم حین مصرف دارو :

- بهتر است دارو را بعد از صرف غذا میل نمود تا نشانه های گوارشی کاهش یابد. حتما باید قرص با یک لیوان پر آب بلعیده شود.
- سعی کنید پلاویکس را هر روز در زمان مشخصی مصرف کنید. مصرف این دارو در زمان مشابه در هر روز کمک به اثربخشی بهتر دارو می کند. همچنین کمک می کند زمان مصرف دارو را بهتر به یاد بسپارید.
- دارو را در درجه حرارت ۲۰-۱۵ درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری نمایید.



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

بیمارستان امام حسین (ع) بيجار

قرص پلاویکس (کلوپیدوگرل)



IHH-PE-PA-CCU10

واحد آموزش به بیمار و سلامت همگانی

شماره تلفن: ۰۸۷۳۸۲۳۶۰۶۸

آدرس وب سایت بیمارستان:

<https://muk.ac.ir/Page?pagelid=۲۳>

منبع: کتاب فارماکولوژی

عوارض جانبی احتمالی این دارو چیست؟

- همانند داروهای دیگر داروی پلاویکس نیز دارای عوارض جانبی احتمالی است. در صورت مشاهده علائم جدی زیر سریعاً پزشکتان را مطلع سازید:
- واکنش های افزایش حساسیت شامل: خارش، کهیر، تورم در صورت، لب ها، زبان و گلو، تنگی نفس
- مدفوع خونی، سیاه و یا قیری رنگ
- تغییر در مقدار و دفعات ادرار
- تب، لرز و گلو درد
- افزایش وزن سریع
- ادرار قرمز و یا قهوه ای تیره
- درد شدید معده
- تورم در دست و پا
- خونریزی و یا کبودی غیر طبیعی
- اسهال، تهوع، درد و ناراحتی معده
- سردرد و یا گیجی
- درد پشت یا درد مفاصل
- ضعف و یا خستگی

• مواردی مانند اسهال و خونریزی های زیر جلدی و تب و لرز و گلودرد و راش های پوستی را به پزشک گزارش دهید.

• باید داروی پلاویکس برای مدتی که پزشک تجویز کرده است مصرف شود. کاهش و یا افزایش طول درمان می تواند مشکلات جدی برایتان ایجاد کند.

• ممکن است قطع خونریزی (در صورت آسیب) در طول مدتی که این دارو را مصرف می کنید، طولانی تر شود. از ورزش های سنگین و موقعیت هایی که ممکن است شما را دچار کبودی، بریدگی و آسیب کند دوری کنید. در هنگام استفاده از اجسام تیز، بسیار دقت کنید.

• در صورت مشاهده خونریزی غیر طبیعی بینی یا وجود خون در ادرار و یا مدفوع در طول مصرف این دارو، پزشکتان را حتماً مطلع سازید.

• پزشک معالج شما نیاز به پایش بعضی فاکتورهای خونی شما از طریق انجام آزمایش خون دارد. زمان های مقرر شده ویزیت توسط پزشکتان را جدی بگیرید.

• در صورت فراموش کردن یک دوز دارو، به محض به خاطر آوردن دوز فراموش شده، آن را مصرف کنید. اما اگر تقریباً زمان مصرف دوز بعدی فرا رسیده است، نوبت فراموش شده را رها کنید و طبق برنامه منظم خود عمل کنید. از اضافه کردن یا دو برابر کردن مقدار دارو برای جبران نوبت فراموش شده پرهیزید.